

Bērnu vakcinācijas kalendārs



B hepatīts¹

Tuberkuloze

(kombinētā vakcīna)
Difterija, Stinguma krampji, Garais klepus, Poliomielīts, b tipa Haemophilus influenzae infekcija, B hepatīts

(kombinētā vakcīna)
Difterija, Stinguma krampji, Garais klepus, Poliomielīts, b tipa Haemophilus influenzae infekcija, B hepatīts

(kombinētā vakcīna)
Difterija, Stinguma krampji, Garais klepus, Poliomielīts, b tipa Haemophilus influenzae infekcija, B hepatīts

(kombinētā vakcīna)
Difterija, Stinguma krampji, Garais klepus, Poliomielīts, b tipa Haemophilus influenzae infekcija, B hepatīts

(kombinētā vakcīna)
Difterija, stinguma krampji, garais klepus, poliomielīts

(tikai meitenēm)
Cilvēka papilomas vīrusa infekcija³

(kombinētā vakcīna)
Difterija, stinguma krampji, poliomielīts

(kombinētā vakcīna)
Difterija, stinguma krampji

(tikai meitenēm)
Masaliņas²

B hepatīts⁴

(kombinētā vakcīna)
Masalas, epidēmiskais parotīts, masaliņas

Pneimokoku infekcija

Pneimokoku infekcija

Rotavīrusu infekcija (3. pote)

(kombinētā vakcīna)
Masalas, epidēmiskais parotīts, masaliņas

Pneimokoku infekcija

Vējbakas

Rotavīrusu infekcija (1. pote)

Rotavīrusu infekcija (2. pote)

Vakcinācijas kalendārs ir viegli lietojams - atrodi bērna vecumu un uzzini, pret kuru infekcijas slimību, atbilstošajā vecumā, bērns obligāti jāvakcinē, lai novērstu smagas un nāvējošas saslimšanas.

Atceries! Vakcinācija ir labākais un efektīvākais veids, kā bērnu pasargāt no bīstamām un nāvējošām infekcijas slimībām!

Nevakcinētam bērnam apmeklējot skolu vai bērnudārzu, palielinās inficēšanās risks gan pašam nevakcinētajam bērnam, gan apkārtnējiem.

Atbilstošajā vecumā paredzētās potes ir iespējams veikt vienlaicīgi un tas nemazina to iedarbību.

Uz visiem neskaidrajiem jautājumiem par bērnu vakcināciju - atbildēs ģimenes ārsts.



Valsts apmaksātā jeb obligātā vakcinācija ietverta Vakcinācijas kalendārā - tā pienākas ikvienam bērnam, arī tad, ja viņš nav bijis vakcinēts savlaicīgi (medicīnisku vai citu iemeslu dēļ). Nokavējot noteikto vakcīnas ievadīšanas vecumu, ievadīt papildus devu nav nepieciešams. Ar ģimenes ārstu jāvienojas par turpmāko vakcinācijas grafiku.



Slimību profilakses un kontroles centrs

¹ **B hepatīts pirmajās 0-12 dzīves stundās:** Vakcīnu pret B hepatītu ievada tikai riska grupas jaundzimušajiem (bērniem, kuri dzimuši B hepatīta virsmas antigēna (HBsAg) pozitīvām mātēm vai mātēm, kuras nebija pārbaudītas HBsAg klātbūtnes noteikšanai).

² **Masaliņas 12 gados:** Pret masaliņām vakcinē nevakcinētas vai nerevakcinētas meitenes, izņemot tās, kuras pārslimojušas masaliņas un kurām diagnoze "masaliņas" apstiprināta seroloģiski. Vakcinācijai un revakcinācijai izmanto kombinēto MPR vakcīnu.

³ **Cilvēka papilomas vīrusa infekcija 12 gados:** vakcinācija sastāv no divām potēm, kuras ievada atbilstoši zāļu lietošanas instrukcijai.

⁴ **B hepatīts 14 gados:** Vakcinē tikai agrāk nevakcinētos bērnus.

